



la línea de antiparasitarios más completa es de **agrovvetmarket**

# ECTOMETHRIN

## Pour On

Cipermetrina 6,5%



## Aplicación directa, resultados inmediatos

- Elimina eficazmente la mosca de los cuernos, piojos chupadores, masticadores, moscas y mosquitos.
- Fácil empleo con el dosificador POUR-MATIC®.
- No se acumula en los tejidos grasos.
- Baja toxicidad.
- Reduce el stress y maltrato en los animales.
- Ideal para dosificación de pocos animales.
- Aplicación directa, reduce el desperdicio del producto.



### ECTOMETHRIN Pour On

Cipermetrina 6,5%

**DESCRIPCIÓN** Ectomethrin® Pour On es un ectoparasitocida en base a cipermetrina, un piretroide sintético, no sistémico, de amplio espectro, de fuerte efecto de choque, prolongado efecto residual y acción repelente que actúa por contacto e ingestión. Ectomethrin® Pour On es una formulación de alto estándar de calidad y fotoestabilidad comprobada. Posee un alto índice de seguridad por su muy baja toxicidad para mamíferos. Se recomienda para controlar ectoparásitos sobre los animales. No es mutagénico, teratogénico ni carcinogénico y no se acumula en tejidos grasos. **INDICACIONES** Es un poderoso antiparasitario externo, formulado especialmente para la aplicación pour on (línea media dorsal). Corresponde a un piretroide de comprobado efecto insecticida. Esta indicado para el control y tratamiento de infestaciones de la "mosca de los cuernos" (*Haematobia irritans*), piojos chupadores y masticadores (*Haematopinus eurysternus*, *Solenopotes capillatus*, entre otros), tratamiento y control de *Melophagus ovinus* y como repelente de *Stomoxys calcitrans* ("mosca brava"), tabánidos, otras moscas y mosquitos en bovinos, ovinos, porcinos y camélidos. Acción repelente contra insectos en general. Su acción residual es de entre 5 y 6 semanas. **ESPECIES DE DESTINO** Bovinos, ovinos, camélidos sudamericanos, porcinos y equinos. **DOSIFICACIÓN** Bovinos: 10 mL por animal. Para animales de más de 400 kg la dosis es de 20 mL por animal. Ovinos y camélidos sudamericanos (hasta 45 días postesquila): 5 mL por animal, luego de 45 días post-esquila 6-7 mL por animal. Si el animal tiene lana larga, abrir el vellón y aplicar directamente sobre la piel. Porcinos: 5 mL por animal. Equinos: 20 mL por animal, repartida entre la línea media desde la cruz hasta el anca (10mL) y 5 mL en cada ijar. Aplicar con el dosificador del envase exclusivo Pourmatic®, derramando la dosis indicada en la línea media dorsal desde la cruz hasta la zona lumbar. Repetir el tratamiento a los 35 días. **PERÍODO DE RETIRO** Entre el último tratamiento y la faena o el destino de leche a consumo o industrialización deben transcurrir no menos de 48 horas. **PRESENTACIÓN** Frasco Pourmatic® x 500 mL y 1 Litro.

V1.200510



**agrovvetmarket**  
animalhealth

"Productos veterinarios de clase única para el mercado nacional e internacional"

